


تیغ دو لبه کرونا برای بیماران قلبی

کارشناس مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر گفت: در حال حاضر بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا بوده و سالانه بیش از هفتده میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می‌کنند که ۳۱ درصد کل مرگ‌های جهانی و نیمی از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیر واگیر است. آزاده سالمی عنوان کرد: تیش قلب، معنی واقعی زنده بودن را نشان داده بطوری‌که حتی افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند نیز هنوز زنده هستند لذا مراقبت از قلب، حیاتی‌ترین اقدام است. این کارشناس اظهار کرد:



بیشتر مرگ‌های مرتبط با بیماری‌های قلبی - عروقی ناشی از بیماری کرونا قلب یا سکتة مغزی بوده که عوامل خطر اصلی آن شامل فشار خون بالا، کلسترول و قند خون بالا، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا است. وی با بیان اینکه در زمان بحران بیماری کووید ۱۹، بیماران قلبی عروقی با تهدید دو لبه مواجه خواهند شد گفت: این بیماران نه‌تنها در معرض ابتلای نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیم‌تر هستند بلکه ممکن

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص و جراح پوست و مو بررسی کرد

علایم بیماری رزاسه و راه‌های درمان آن

آفتاب یزد - گروه زندگی: آیا پوستتان قرمز، خشک، پوسته پوسته و خارش دار است؟ آیا به بیماری رزاسه مبتلا شده اید؟ در این شرایط چگونه می‌توانید از پوست خود مراقبت کنید؟ بیماری رزاسه چیست و چگونه درمان می‌شود؟ این موضوع شاید نگرانی بسیاری از افراد باشد. رزاسه یا سرخی صورت نوعی بیماری مزمن است که میلیونها نفر را مبتلا کرده است لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر وحید حمیدی، متخصص و جراح پوست و مو گفتگو کرده است. وی در این باره می‌گوید: رزاسه یک بیماری پوستی مزمن است که صورت را درگیر کرده و یا دوره‌های خفیف و شدید همراه است و اغلب بعد از سی سالگی ایجاد می‌شود.

دکتر وحیدی ادامه داد: در صورت ابتلا به این بیماری اغلب چانه، گونه و پیشانی گرفتار می‌شود ولی می‌تواند سر، سینه، گردن و گوش‌ها را نیز درگیر کند.

این متخصص و جراح پوست و مو بیان کرد: ضایعات ایجاد شده به دلیل بیماری رزاسه خود را به صورت پاپول‌های قرمز کوچک و مویرک‌های ظریف نشان می‌دهد و به مرور بیشتر و فرم‌تر می‌شود که در صورت عدم درمان ضایعات بزرگتر شده و ممکن است به ویژه در آقایان بینی بزرگتر و روم کرده و قرمز شود که مشخصه رزاسه است و گاهی نیز ملتحمه چشم‌ها قرمز شده و احساس خارش در آن مشاهده می‌شوند.

وی اظهار داشت: هرچند بیماری رزاسه تمام نژادها و تیپ‌های پوستی را درگیر می‌کند ولی نژاد سفید و پوست‌های روشن تمایل بیشتری برای ابتلا دارند و خانم‌ها بیشتر در معرض ابتلا هستند اما مردها شدیدتر دچار می‌شوند و اغلب بیماران تا زمانی که دچار فرم شدیدتر نشده باشند نیازی به مراجعه به پزشک را احساس نمی‌کنند.

دکتر وحیدی ادامه داد: بیماری رزاسه قابلیت درمان قطعی را ندارد و علت آن کاملا مشخص نیست و درمان‌های پزشکی فقط برای کنترل و مهار بیماری در دسترس هستند لذا افرادی که احساس می‌کنند دچار این بیماری هستند باید به متخصص پوست مراجعه کرده تا تحت تشخیص و درمان مناسب قرار گیرند.

این متخصص و جراح پوست و مو مطرح کرد: تظاهرات رزاسه در افراد مختلف، متفاوت است. نشانه‌های اولیه رزاسه بر آفروختگی و گر گرفتگی است.

وی توضیح داد: بسیاری از بیماران مبتلا به رزاسه سابقه‌ای از دوره‌های گر گرفتگی و برفروختگی را بیان می‌کنند. برفروختگی اولین نشانه این بیماری است و گاهی با خوردن نوشابه‌ها و غذاهای

چای سبز را در این زمانها نوشید

زمان نوشیدن چای سبز بسیار مهم است؛ به گونه‌ای که برخی اوقات نوشیدن آن بیشتر از آنکه مفید باشد مضر است، بنابراین باید برخی اوقات که در این گزارش به آن اشاره می‌شود از نوشیدن چای سبز پرهیز کرد:

پیش از خواب: به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگر از مشکلات بی‌خوابی رنج می‌برید، شما نباید پیش از خواب چای سبز بنوشید. علی‌رغم آنکه این چای به خواص آرامبخشی معروف است، اما مشوق مناسبی برای خواب نیست، زیرا حاوی ماده کافئین بوده و می‌تواند ترشح میلانتونین را کاهش دهد که این موضوع مانع از خواب راحت و مناسب خواهد بود. **هنگام بیدار شدن از خواب:** شاید تا به حال گمان می‌کردید نوشیدن چای سبز با معده خالی می‌تواند منجر به آغز فرآیند متابولیسم و سوخت و ساز غذا شود، اما واقعیت غیر از این است؛ به گونه‌ای که آنتی‌اکسیدان قوی و بولیفینول موجود در چای سبز اسید معده را افزایش می‌دهد که این حالت ممکن است باعث ناراحتی معده شود.

بلافاصله پس از استفاده دارو: اگر عادت دارید که داروهایتان را با یک فنجان چای میل کنید، باید این کار را متوقف کنید؛ چراکه خوردن دارو همراه و یا پس از نوشیدن چای سبز زینابار بوده و ترکیب مواد شیمیایی موجود در داروها با چای سبز موجب ترش کردن می‌شود؛ بنابراین همیشه توصیه می‌شود داروهایتان را فقط با آب میل کنید. **همراه با پس از غذا خوردن:** چای سبز به فرآیند هضم غذا کمک می‌کند، اما اگر شما همراه غذا یا بلافاصله پس از آن این چای را بنوشید مانع از جذب عناصر غذایی برای بدن شده که در دراز مدت منجر به کمبود بسیاری از مواد مغذی و مورد نیاز در بدن‌تان خواهد شد؛ در نتیجه توصیه می‌شود دست کم بین وعده غذایی و نوشیدن چای سبز یک ساعت فاصله بیندازید.

ارتباط مصرف مستمر داروهای ضد ریفلاکس اسید معده با ابتلا به دیابت

محققان دریافتند مصرف دائمی داروهای ضد ریفلاکس اسید معده که با عنوان داروهای مهارکننده پمپ پروتون شناخته می‌شود، با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ ارتباط دارد. به گزارش ایرنا، محققان تحقیق خود را در سال ۲۰۱۴ میلادی و با استفاده از اطلاعات ۲۰۴ هزار و ۶۸۹ مرد و زن ۲۵ تا ۷۵ ساله که در مطالعه سلامت پرستاران آمریکا گردآوری شده بود، آغاز کردند. این اطلاعات از زمان آغاز مطالعه در سال ۱۹۸۹ میلادی در فواصل زمانی دو ساله به روزرسانی شده و درگیرنده سابقه پزشکی، رفتارهای مرتبط با سلامتی و بیماری‌های هریک از داوطلبان بود. بر اساس این تحقیقات هرچه مدت مصرف این داروها طولانی‌تر باشد، خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ نیز افزایش می‌یابد و افرادی که این داروها را برای مدتی بیش از دو سال مصرف می‌کنند، باید به طور مرتب تحت نظر باشند و میزان گلوکز خون آن‌ها اندازه‌گیری شود. در واقع خطر قطعی سالانه ابتلا به دیابت نوع دو در افرادی که به طور مستمر داروهای ضد ریفلاکس مصرف می‌کردند، ۷.۴۴ درصد بود، در حالی که میزان این خطر در افرادی که دارو را مصرف نمی‌کردند ۴.۲۲ درصد بود. داروهای مهارکننده پمپ پروتون جزء ۱۰ داروی پر مصرف جهان هستند و برای درمان ریفلاکس اسید، زخم معده و سوءهاضمه مصرف



یک بیمار مبتلا به رزاسه علاوه بر دارو درمانی باید شرایط محیطی و سبک زندگی خود را به گونه‌ای متناسب با بیماری رزاسه تغییر دهد و از فاکتورهایی که باعث شعله‌ور شدن بیماری می‌شود، پرهیز نماید

● **درمان‌های خوراکی و موضعی متعددی برای درمان مشکلات پوستی بیماری رزاسه وجود دارد اما متخصصین پوست از یک درمان اولیه و فوری برای کنترل بیماری و سپس یک درمان نگهدارنده موضعی دراز مدت استفاده می‌کنند**

داغ ایجاد می‌شود. قرمزی پایدار در صورت که ممکن است شبیه به یک آفتاب سوختگی باشد نیز از شایع‌ترین علائم این بیماری است که از بین نمی‌رود.

دکتر وحیدی افزود: دانها و جوش‌های کوچک و بزرگ که برخی چرکی هستند نیز اغلب در این افراد دیده می‌شوند که شبیه آکنه و باجوش‌های بلوغ می‌باشد.

این متخصص و جراح پوست و مو مطرح کرد: مویرک‌های خونی ظریف قابل دید نیز در برخی از افراد مبتلا به رزاسه ممکن است به وجود بیاید و در برخی بیماران نیز سوزش و تحریک و قرمزی چشم به وجود می‌آید و پلک‌ها نیز ممکن است متورم شوند و گل مژه ایجاد شود.

وی افزود: در افراد مبتلا به بیماری رزاسه احساس سوزش و تحریک روی صورت مشاهده می‌شود و بیمار احساس سفتی روی پوست می‌کند و قسمت میانی صورت نیز خشک و کلفت می‌شود.

کمبود ویتامین دی باعث سرطان می‌شود

یک متخصص بیماری‌های عفونی در خصوص نقش ویتامین دی در بدن گفت: مهم‌ترین نقش ویتامین دی حفظ سطح کلسیم خون است و به تبع آن استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها... را به دنبال دارد. مهم‌تر از همه این ویتامین جزو ال‌مان‌های اصلی در سیستم بدن است. محمدجواد دهقان نیری در گفتگو با ایسنا ادامه داد: کمبود ویتامین دی در بدن می‌تواند منجر به پوکی استخوان و ایجاد نقص در سیستم ایمنی و دفاعی بدن شود. همچنین کمبود این ویتامین اختلالاتی را در سیستم ایمنی بدن به وجود می‌آورد که زمینه‌ساز ایجاد سرطان از جمله سرطان مثانه است. این متخصص بیماری‌های عفونی اضافه کرد: مهم‌ترین منبع ویتامین دی بافت پوست و اشعه خورشید است. همچنین در خصوص منشأ خوراکی برای دریافت این ویتامین با توجه به اینکه اکثر خوراکی‌هایی که در دسترس ما هستند از نظر ویتامین دی فقیرند، اما می‌توان این ویتامین را به مقدار کمی از طریق محصولات دریایی کاملا تازه و گوشت و تخم‌مرغ دریافت کرد اما مقدار دریافت ویتامین از این طریق بسیار کم است و در حال حاضر با توجه به آلودگی هوا و اینکه اشعه سازنده ویتامین دی نمی‌تواند از این هوای آلوده عبور کند، کمبود ویتامین دی در بدن افراد تشدید شده است. وی در خصوص مصرفی رویه مکمل‌های ویتامین دی بیان کرد: مسلما مصرف ویتامین دی یک سطح حداکثر و حداقلی را شامل می‌شود که مصرف بالاتر از سطح تعیین شده موجب مسمومیت می‌شود. این متخصص بیماری‌های عفونی در خصوص مصرف ویتامین دی در دوران کرونا اظهار کرد: ایده مصرف ویتامین دی در این دوران مطرح شده اما کاملا ثابت شده نیست و اینکه نمی‌تواند توصیه قطعی باشد، اما با توجه به اینکه هر کاری برای جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا را توصیه می‌کنیم این امر نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

رشد نوزادان نارس اوتیسم از ۶ ماهگی غیر طبیعی است

نتایج یک مطالعه و بررسی جدید که توسط محققان انجام شده، نشان می‌دهد برخی از نوزادان نارس که بعدا دچار بیماری اوتیسم شدند در دوران نوزادی خود از مشکل تأخیر در رشد رنج می‌برند. به گزارش سلامت نیوز، لی-ون چن، متخصص مغز و اعصاب کودکان در این رابطه می‌گوید که این الگوی مشخص می‌تواند به پزشکان کمک کند تا اوتیسم را در نوزادان نارس شناسایی کرده و روش‌های درمانی را برای آن‌ها زودتر آغاز کنند.

یافته

داروی دیابت کاندیدایی برای درمان کووید-۱۹

محققان دریافتند در بین بیش از ۶۰۰ بیمار مبتلا به دیابت و کووید ۱۹، مصرف متفورمین با کاهش حدود ۷۰ درصدی نرخ مرگ و میر در بیماران کووید ۱۹ مرتبط بود. به گزارش مهر، تاکنون داده‌های مربوط به چندین مطالعه جهانی هم نشان داده است که متفورمین در پیشگیری از بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از کووید ۱۹ مؤثر بوده است. دکتر «کارولین برامانت»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «مکانیسم تأثیر متفورمین در کاهش مرگ ناشی از کووید ۱۹، تأثیر این دارو در کاهش التهاب و توانایی‌اش در ممانعت از "mTOR" است؛ پروتئینی که به رشد ویروس کمک می‌کند.» داروی متفورمین داروی بیماری دیابت است که میزان گلوکز خون را کاهش می‌دهد. از عوارض مفید این دارو کاهش اشتها و کاهش وزن است. برخی نتایج نشان داده‌اند زنانی که متفورمین مصرف می‌کردند و مبتلا به کووید ۱۹ شده بودند حدود ۲۵ درصد کمتر با ریسک مرگ روبرو بودند.



تازه‌ها

واکسن کووید-۱۹ کودکان چه زمانی قابل دسترس است؟

در رقابت برای تولید واکسن کووید-۱۹ ممکن است بسیاری از ما درک نکنیم که تولید واکسیناسیون برای کودکان بیشتر طول می‌کشد. به گزارش ایسنا، دکتر دیو هندیبا باید از محصولات مراقبت پوستی ملایم و ضد آفتاب‌های با درجه محافظت ۱۵ یا بالاتر استفاده کنند و از پوشاندن‌های آرایشی نیز می‌توان برای پنهان کردن ناخن‌های‌های پوستی این بیماران استفاده کرد. این متخصص و جراح پوست و مو در پایان گفت: یک بیمار مبتلا به رزاسه علاوه بر دارو درمانی باید شرایط محیطی و سبک زندگی خود را به گونه‌ای متناسب با بیماری رزاسه تغییر دهد و از فاکتورهایی که باعث شعله‌ور شدن بیماری می‌شود، پرهیز نماید.

تأثیر زهر زنبور عسل بر سرطان پستان

سرطان پستان یکی از شایع‌ترین انواع سرطان است. این بیماری با روش‌های جراحی، شیمی‌درمانی، هورمونی‌درمانی یا ژن‌درمانی درمان می‌شود. از آن‌جا که شیمی‌درمانی یکی از روش‌های رایج در درمان سرطان‌هاست، یافتن دارویی با کم‌ترین عوارض جانبی در اولویت‌های پژوهشگران قرار دارد. به گزارش ایسنا، خواص ضد التهابی و ضد تکثیر سم زنبور عسل به دلیل داشتن ترکیبات مختلفی از جمله آنزیم‌ها، هیستامین‌ها و... اثبات شده است. به همین خاطر پژوهشگران با طراحی آزمایشی به بررسی اثرات ضد سرطانی این سم در سلول‌های سرطان پستان پرداختند. حسین ذوالفقاریان و مهدی بابانی، پژوهشگران بخش جانوران سمی و تهیه پادزهر موشه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و سیمیا خلیل‌فرد بروجنی، کارشناس دانشگاه بیوشیمی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران، در انجام این مطالعه همکاری داشتند.


محققان برای انجام این آزمایش محلول زهر زنبور عسل را با دوزهای مختلف به محیط کشت سلول‌های سرطان پستان "MDA-MB-۲۳۱" آشفه کرده و پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت آن‌ها را با سلول‌های سرطانی عادی گروه کنترل مقایسه کردند. در این بررسی‌ها میزان بقا، ریختشافی ظاهری، آپوپتوز و میزان قطعه‌قطعه شدن DNA اندازه‌گیری شد. نتایج این بررسی‌ها حاکی از این بود که میزان بقای سلولی با افزایش دوز زهر روند کاهش داد. همچنین مشاهدات ریختشافی سلول‌ها نشان داد که کاهش سلول‌های سرطانی که در معرض زهر زنبور عسل بودند، نسبت به سلول‌های کنترل کم‌تر و از نظر اندازه به طرز چشم‌گیری کوچک‌تر بودند. شکل طبیعی سلول‌ها از بین رفته بود و سلول‌ها چروکیده شده بودند. همچنین تجمع سلولی و سیتوپلاسم حباب‌دار مشاهده می‌شد.



نواوری

کاهش درد ناشی از پارکینسون با تحریک الکتریکی نخاع

پژوهشگران در بررسی جدیدی دریافتند که شاید تحریک الکتریکی مغز بتواند دردهای ناشی از بیماری پارکینسون را کاهش دهد. به گزارش ایسنا، گروهی از پژوهشگران در بررسی‌های خود دریافتند که تحریک الکتریکی نخاع می‌تواند درد و مشکلات حرکتی ناشی از پارکینسون را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. پژوهشگران، ۱۵ بیمار مبتلا به پارکینسون را مورد بررسی قرار دادند. میانگین سنی بیماران، ۴۷ سال و میانگین مدت بیماری آنها ۱۷ سال بود. همه بیماران از درد رنج می‌بردند و در درمان‌های پیشین بهبود نیافته بودند. هشت نفر از بیماران با یک روش غیرتهاجمی موسوم به "DBS" تحت درمان قرار گرفتند که طی آن، جریان‌های الکتریکی با کمک الکترودها، به بخش‌هایی از مغز وارد می‌شوند. هفت نفر از بیماران نیز تنها درمان دارویی را دریافت کردند. پژوهشگران از همه بیماران خواستند تا بهبودی‌های قابل توجه خود را گزارش دهند و پس از بررسی نتایج دریافتند که میزان درد در آنها ۵۹ درصد کاهش یافته است. پژوهشگران با دراز کردن معده و تلخی طعم دهان است. ریفلاکس مزمن زمانی خطرناک می‌شود که پوشش مری از بین برود. در این حالت احتمال بروز سرطان افزایش می‌یابد. راهکارهای متفاوتی برای درمان این عارضه وجود دارد و در برخی موارد جراحی توصیه می‌شود. تغییر شیوه زندگی و کاهش وزن می‌تواند در رفع این مشکل مؤثر باشد. برخی از دلایل تشدید ریفلاکس سینگار، کشیدن، با عجله غذا خوردن، مصرف غذاهای چرب و پرادویه، پوشیدن لباس‌های تنگ، مصرف غذاهای تحریک‌کننده اسید معده مانند گوجه فرنگی، آب مرکبات، چای و قهوه، پیاز، سیر، نوشابه‌های گازدار، دراز کشیدن بعد از غذا، نوشیدن مایعات و بی‌تحریکی است. برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که جویدن آدامس پس از غذا باعث تحریک بزاق و کاهش ریفلاکس می‌شود.



نکته

مردم برای جراحی زیبایی و سوسه تبلیغات نشوند

نایب رئیس انجمن جراحان زیبایی و پلاستیک ایران هشدار داد که جراحان عمومی اجازه جراحی زیبایی را ندارند و مردم نباید با تبلیغات وسوسه شوند. به گزارش ایرنا، بابک نیکومرام افزود: تبلیغات جراحی زیبایی در فضای مجازی و تبلیغات گسترده اغواکننده است و در شرایط کنونی برخی پزشکان غیرمتخصص زیبایی و پلاستیک اقدام به جراحی در این زمینه بصورت غیر قانونی می‌کنند. وی تصریح کرد: از مردم می‌خواهیم آگاهی خود را بالا برده و فریب تبلیغات را نخورند، اعمال زیبایی باید فقط توسط جراحان زیبایی و پلاستیک انجام شود تا دچار عارضه جبران‌ناپذیر نشوند. نیکو مرام اعمال زیبایی را پرسود و نوعی تجارت دانست و افزود: به عنوان مثال پروتز سینه مانند شیمی درمانی بوده و فقط باید توسط جراح زیبایی انجام شود یا در زمینه لیپوساکشن با تایید دیوان عدالت اداری جراح عمومی این عمل را انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: اگر نظراتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بر اعمال زیبایی توسط افراد غیرمتخصص نشود تا چند سال دیگر قیافه ایرانیان عجیب و غریب مانند بینی عمل کرده و ابرو کشیده و غیره خواهد شد. این جراح زیبایی تصریح کرد: انجمن زیبایی و پلاستیک ایران آمادگی دارد با همکاری سایر انجمن‌ها قوانینی را برای اعمال جراحی تعیین کند. آخوندی نسب جراح زیبایی و پلاستیک نیز در این باره گفت: برخی تکنیک‌های جراحی بیمار برای جراحان عمومی برای اعمال زیبایی معرفی کرده و پورسات می‌گیرند از مردم می‌خواهیم که با نخبورند. وی افزود: در شرایط کنونی فرب تا سه سال دیگر با این ویروس کشور درگیر است اعمال زیبایی باید ادامه یابد اما در اولویت نیست. حامد باطنی، رئیس انجمن جراحان زیبایی و پلاستیک ایران نیز گفت: وضعیت کنونی گستردگی و شیوع مداخلات زیبایی در سطح جامعه را افزایش داده است. وی اظهار داشت: افراد غیر حرفه‌ای بدون توجه به رعایت دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اقدام به جراحی زیبایی می‌کنند که برای بیماران عارضه‌ای ملی ایجاد می‌شود. باطنی تصریح کرد: نباید سلامت مردم به خطر بیفتد و از بیماران می‌خواهیم که قبل از انجام هر گونه عمل زیبایی به مهارت و دانش پزشکی و تخصص وی در زمینه جراحی زیبایی آگاهی کسب کنند. وی تأکید کرد: در شرایط کنونی همه استانداردها را لحاظ و اعمال زیبایی را محدود کرده ایم. عبدالجلیل کلاتری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز گفت: از مردم می‌خواهیم مراقب جان خود باشند و در این شرایط کنونی کار غیر ضروری و غیر اورژانسی را انجام ندهند. وی افزود: فریب تبلیغات در فضای مجازی را نخورند.



افراد غیر حرفه‌ای بدون توجه به رعایت دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اقدام به جراحی زیبایی می‌کنند که برای بیماران عارضه‌ای ملی ایجاد می‌شود

هشدار

بروز التهاب چشمی در بسیاری از بهبودیافتگان کرونا

محققان در مطالعه‌ای جدید دریافتند که درصد بالایی از بیماران بهبودیافته از کووید ۱۹ دچار التهاب چشمی شده‌اند که نوعی التهاب عصبی است. به گزارش مهر، در این مطالعه، در مجموع ۱۵ شرکت‌کننده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج اسکن چشمی نشان داد که همزمان با ابتلاء این افراد به کووید ۱۹، آنها دچار التهاب چشمی هم بودند. یافته‌ها نشان داد التهاب عصبی در افرادی که از بیماری کووید ۱۹ بهبودیافته بودند وجود داشت. طبق نتایج اسکن چشم این بیماران، وجود سلول‌های ملتهب متعدد در حفره زجاجیه غیرعادی است. محققان دریافتند بیماری کووید ۱۹ می‌تواند منجر به بقا سلول‌های التهابی در چشم تا بیش از یک ماه بعد از بهبود شود.

